INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA CON GOLYTELY

Nombre del paciente _____ N.º de cuenta _____

Lugar del procedimiento: ◯ Stone Springs Hospital
Dirección
◯ Prince William Surgery Center
Dirección

FECHA DEL PROCEDIMIENTO: _____
HORA DE LLEGADA: _____

Compre los siguientes productos:
GoLytely recetado, disponible en su farmacia.
Caramelos de menta para aliviar las náuseas.
Un frasco de Miralax si tiene estreñimiento o un IMC superior a 35.

7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

1) Si tiene menos de 3 evacuaciones intestinales por semana O un IMC superior a 35, comience a tomar una medida de Miralax cada mañana.

2) Si toma OZEMPIC, WEGOVY, MONJARO, RYBELIUS, TRULICITY, VICTORZA u otro medicamento GLP-1, suspéndalo.

5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

1) NO consuma semillas, frutos secos, granos integrales, piel de tomate, verduras crudas, maíz, palomitas, salvado ni chía.

2) SUSPENDA los suplementos de hierro, vitamina E, aceite de pescado omega-3, aceite de linaza, aceite de hígado de bacalao, medicamentos herbales y fentermina.

3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

1) Suspenda la aspirina de 325 mg y otros AINE (Aleve, Advil, Motrin, ibuprofeno, naproxeno, Excedrin, Bufferin, Celebrex, Mobic, etc.), salvo indicación contraria. Puede tomar Tylenol.

3) Confirme quién lo llevará a casa tras el procedimiento. Comience a consumir alimentos más blandos.

Si tiene diabetes, quizá deba suspender los hipoglucemiantes orales la mañana del procedimiento. Consulte con el médico que se los recetó. También puede ser necesario ajustar la insulina.

DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO:

1) Al despertarse, consuma solo líquidos claros: agua, bebidas deportivas (azul, verde, blanco o amarillo), jugo de manzana, caldo, café o té (sin leche ni crema), refrescos, gelatina y paletas heladas. Manténgase bien hidratado. Mezcle la solución y refrigérela. Puede añadir el saborizante incluido con la preparación intestinal.

2) 6:00 PM: Beba un vaso de 8 oz cada 15 minutos hasta terminar la primera mitad de la solución. Refrigérela. Si siente molestias, beba más despacio y tome un caramelo de menta para calmar el estómago.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO a las _____ (hora)

1) Beba un vaso de 8 oz cada 15 minutos hasta terminar la segunda mitad de la solución. Si siente molestias, beba más despacio y tome un caramelo de menta para calmar el estómago.

2) Tome los medicamentos para la presión arterial o la ansiedad con un pequeño sorbo de agua.

NO INGIERA NADA POR BOCA DESPUÉS DE TERMINAR LA SOLUCIÓN.

POR FAVOR, LEA LA PÁGINA 2

QUÉ TRAER: Ropa cómoda; identificación, tarjeta de seguro y lista de medicamentos.
NO TRAIGA: Joyas, objetos de valor ni lentes de contacto. NO se aplique lociones, cremas ni ungüentos sobre la piel.

CONDUCTOR: Es obligatorio que un adulto permanezca en el lugar durante el procedimiento, lo lleve a casa y asuma la responsabilidad de su cuidado después. De lo contrario, se cancelará el procedimiento.

NO SE LE PERMITIRÁ CONDUCIR DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO DEBIDO A LA ANESTESIA.

CANCELACIONES: Deben hacerse de lunes a viernes, de 9 AM a 4 PM. Las cancelaciones realizadas con menos de 72 horas de anticipación y las ausencias sin aviso tendrán un cargo de $200.00, no facturable al seguro.

Facturaremos a su seguro como cortesía.

CATEGORÍAS DE COLONOSCOPIA:
COLONOSCOPIA DE DETECCIÓN: A partir de los 45 años, sin síntomas ni antecedentes de pólipos de colon, cáncer colorrectal, síntomas gastrointestinales o antecedentes familiares de pólipos avanzados o tempranos o cáncer colorrectal. Si padres, hermanos o hijos tuvieron cáncer colorrectal, se recomienda realizar la prueba 10 años antes de la edad a la que se diagnosticó al familiar.

COLONOSCOPIA DE VIGILANCIA: Paciente sin síntomas, pero con antecedentes personales de enfermedad gastrointestinal, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, pólipos de colon o cáncer colorrectal. Se recomiendan colonoscopias a intervalos más cortos. Pueden aplicarse copagos y coseguros de pruebas diagnósticas.

COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA: Paciente con síntomas gastrointestinales actuales, enfermedad gastrointestinal, anemia por deficiencia de hierro u otros análisis o estudios anormales. Pueden aplicarse copagos y coseguros de pruebas diagnósticas.

NOVA INNOVATIVE GASTROENTEROLOGY, PLCC
24430 Stone Springs Blvd., Suite 250
Sterling, VA 20166
571-463-3900 fax 571-470-0064